

COVID19症状別対処の流れ

Nippon Medical Care, Kenichi Sato

16 Feb. 2022記載

リスクと症状・所見の分類

	リスク分類	症状・所見分類
成人 (12歳以上)	<p>高リスク</p> <ul style="list-style-type: none"> ワクチン未完了の80歳以上の方 <p>寄与因子</p> <ul style="list-style-type: none"> 高リスクの免疫抑制者 <ul style="list-style-type: none"> 20mg以上のステロイドを14日以上使用 非ステロイドの免疫抑制剤使用者 固形癌で化学療法実施者 血液癌、移植後 造血幹細胞治療5年以内 原発性免疫不全 HIV(条件あり) 透析 心不全、肝不全、COPDなど慢性疾患 妊娠36週以降、36週未満でワクチン未完了 <p>中リスク</p> <ul style="list-style-type: none"> 肥満 (BMI>35, 体重>100kg) 糖尿病コントロール不良 ワクチン完了した妊娠36週未満の妊婦 ワクチン未完了の70~79歳の方 ワクチン完了した80歳以上の方 リスクの低い免疫抑制患者 	<p>症状</p> <ul style="list-style-type: none"> 呼吸困難 胸痛 急性梗塞の症状 動悸 深部静脈血栓を疑う症状 薬の効かない激しい頭痛 持続的な下痢や嘔吐 水分摂取困難 38度以上の熱が3日以上持続 <p>所見</p> <ul style="list-style-type: none"> 頻脈 (100回/分) 頻呼吸 (20回/分) 低血圧 (<100mmHg以下) 血中酸素飽和度≤94%
小児 (12歳未満)	<p>高リスク</p> <ul style="list-style-type: none"> 3か月未満 <p>寄与因子</p> <ul style="list-style-type: none"> 骨髄・臓器移植など免疫抑制者 癌に対する化学療法実施者 血液系の悪性物治療者 免疫抑制剤使用者 HIV/AIDS(未治療) 透析 糖尿病コントロール不良 高血圧症コントロール不良 心不全、肝不全、COPDなど慢性疾患 先天性心疾患 神経発達障害 <p>中リスク</p> <ul style="list-style-type: none"> 肥満(年齢で異なる) 3か月から3歳の方 	<p>症状</p> <ul style="list-style-type: none"> 呼吸困難 胸痛 動悸 倦怠感 40度以上の高熱 38度以上の熱が5日以上持続 あらゆる部位の著明な痛みや不快感 通常よりも強い頭痛(薬効果なし) 5日以上続く呼吸症状 持続的な下痢、嘔吐、腹痛 水分摂取困難 (通常の半分以下) 脱水 (排尿が1日4回以下) 多系統炎症/川崎病の疑い <p>所見</p> <ul style="list-style-type: none"> 血中酸素飽和度≤94% 頻脈 (年齢で異なる) 頻呼吸 (年齢で異なる)

プロトコール対応表

	症状・所見分類		無症状(自宅) PET/HRWなど	無症状(医療機関) 渡航前検査など
	懸念する症状あり	軽度		
高リスク患者	ART+かつPCR+ → Protocol 1	ART+かつPCR+ → Protocol 1	ART+のみの時は PCRで確定 → Protocol 1	ART+のみの時は PCRで確定 → Protocol 1
中リスク患者	ART+かつPCR+ → Protocol 1	ART+かつPCR+ → Protocol 1	ART+ → Protocol 2	ART+ もしくはPCR+ → Protocol 2
低リスク患者	ART+かつPCR+ → Protocol 1	ART+のみ → Protocol 2 (Primary Care) * PCR+でProtocol1	ART+ → Protocol 2	ART+ もしくはPCR+ → Protocol 2