

## 予防接種の種類

予防接種の種類	望ましい接種時期	基本的な接種回数	他の予防接種との間隔	予約
ポリオ（注射、経口）	3ヶ月から	4回 （当院では注射のポリオは5種・6種混合として接種）	経口ポリオはロタウイルスワクチンとは2週間以上	
DTP（ジフテリア、百日咳、破傷風） 三種混合	1期:3ヶ月から6ヶ月(3回) 1.5歳(追加) 2期:11~12歳	1期:3回（0歳の間に1-2か月間隔）、追加1回（1歳半） 2期:1回（日本では二種混合DT）	1週間以上	
DTP,ポリオ,ヒブ:五種混合	2ヶ月~	3回（1-2か月間隔）、追加1回（1歳半）	1週間以上	
DTP,ポリオ,ヒブ,B型肝炎 六種混合	2ヶ月~	B型肝炎、3種混合、ヒブ、ポリオの未接種の場合、6種混合を0歳時に2か月間隔で3回接種可能。（ただし1歳半時の追加は、5種混合）	1週間以上	
ヒブ （b型インフルエンザ菌）	生後6週~5歳	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 生後6ヵ月までに接種開始: 3回（1か月間隔）、追加1回（1年後）</li> <li>• 7ヵ月~1歳未満接種開始: 2回（1か月間隔）、追加1回（1年後）</li> <li>• 1歳以上で接種開始:1回</li> </ul>	1週間以上	要
A型肝炎	1歳以上	2回（6か月~1年間隔）	1週間以上	
B型肝炎	出生時から	3回（2回目は1か月後、3回目は初回の6か月後）	1週間以上	
A,B型肝炎混合	1歳以上	【大人】16歳以上は3回（2回目は1か月後、3回目は初回の6か月後） 【子供】1歳以上15歳以下は2回（6ヶ月間隔）	1週間以上	
インフルエンザ	6か月から	6ヵ月-9歳未満: 2回（4週間隔）（昨年までに2回接種した人は1回） 9歳以上:1回	1週間以上	要
ヒトパピローマウイルス （子宮頸がん）	10~20代の女性	3回（2回目は1か月後、3回目は初回の6ヶ月後）	1週間以上	要
水痘（水ぼうそう）	1歳以降	12-15か月に接種:4~6歳で追加接種（推奨） 13歳以降に接種:2回（6~10週間隔）	4週間以上	
MMR（流行性耳下腺炎、麻疹、風疹）	1期:1歳 2期:1期から3か月後	各期1回	4週間以上	
肺炎球菌	2ヶ月~9歳	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 生後6週から6か月までに接種開始する。 3回（4週以上の間隔）、4回目（12-15か月時）</li> <li>• 7か月から1歳未満に接種開始 2回（4週以上の間隔）、3回目（1歳以降）</li> <li>• 1歳から2歳未満に接種開始 2回（60日間以上の間隔）</li> <li>• 2歳以降に接種開始 1回</li> </ul>	1週間以上	要
ロタウイルス（経口）	6週以降6か月まで	2回接種（初回は生後6-14週、2回目は初回から4週間以上空けて生後14-24週の間）2週間以上	経口ポリオワクチンとは2週間以上	要
髄膜炎菌	2歳以降	1回	1週間以上	要
腸チフス	2歳以降	1回（3年毎追加接種）	1週間以上	要
狂犬病		3回（2回は1回目の1週間後、3回目は2回目の2-3週間後） 追加1回（1年後）	1週間以上	要